

ستیریزین

قرص روکشدار خط دار ۱۰ میلی گرم

شربت خوراکی ۶۰ میلی لیتر (هر ۵ میلی لیتر حاوی ۵ میلی گرم)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• موارد مصرف

- تسکین علائم تب یونجه (رینیت آلرژیک فصلی) و سایر آلرژی‌ها از جمله حساسیت به حیوانات خانگی و گرد و غبار
- تسکین علائم رینیت آلرژیک دائمی (عطسه، خارش، آبریزش و گرفتگی بینی، قرمزی چشم و آبریزش اشک)
- تسکین واکنش‌های پوستی و علائم کهیر مزمن مانند تورم، قرمزی و خارش پوست

• راهنمایی‌های پیش از مصرف

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت حساسیت به ستیریزین یا آنتی هیستامین‌های مشابه (تب ناگهانی، قرمزی پوست و تاول چرکی که نشانه‌ای از واکنش پوستی شدید باشد).
- در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی و کلیوی
- در بیماران مبتلا به عوامل مستعدکننده احتباس ادراری (مانند ضایعه نخاعی، هیپرپلازی پروستات)
- در بیماران مبتلا به صرع یا سابقه تشنج
- در بیماران با سابقه گلوکوم با زاویه بسته

• مقدار و نحوه مصرف

- مقدار مصرف دارو بر اساس شرایط هر فرد توسط پزشک تعیین خواهد شد. اما میزان مصرف این دارو در شرایط آلرژیک به طور کلی به شرح ذیل است:
- در کودکان زیر ۶ ماه منع مصرف دارد.
- کودکان ۶ ماه تا ۲ سال: بهتر است از فرم شربت استفاده شده و طبق دستور پزشک تنظیم دوز صورت گیرد.
- کودکان ۲ تا ۵ سال :
- ۲/۵ تا حداکثر ۵ میلی گرم ۱ بار در روز قبل از غذا
- استفاده از فرم شربت به دلیل تنظیم دوز دقیق‌تر و سهولت مصرف ارجح است
- کودکان ۵ تا ۱۲ سال:
- ۵ تا حداکثر ۱۰ میلی گرم ۱ بار در روز قبل از غذا
- نوجوانان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان:
- ۱۰ میلی گرم ۱ بار در روز قبل از غذا
- در صورت فراموشی مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید. با این حال، اگر بیش از ۱۲ ساعت از زمان مصرف گذشته باشد، از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر کرده و در نوبت بعدی برای جبران، میزان دارو را دو برابر نکنید.

• هشدارها

- این دارو تاثیر چشم گیری بر روی سیستم اعصاب مرکزی ندارد و افراد در حین مصرف ستیریزین هوشیاری لازم جهت کار با ماشین آلات یا رانندگی را دارند ولیکن به دلیل ماهیت فارماکودینامیکی محصول به جهت اطمینان از عوارض غیر معمول دارو در افراد حساس می بایست بررسی گردد. عدم هوشیاری ممکن است با داروهای آرام‌بخش یا مسکن تشدید شود.

- قبل از انجام هر گونه آزمون پوستی برای آلرژی پزشک را از مصرف این دارو آگاه سازید. زیرا ممکن است در نتایج تست تاثیر گذارد.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

- در دوران بارداری، فقط در صورت لزوم و با صلاحدید پزشک مصرف گردد.
- مصرف این دارو بدلیل ترشح در شیر مادر در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

• موارد منع مصرف

- منع مصرف در صورت حساسیت به ستیریزین یا اجزا تشکیل دهنده فرمولاسیون
- منع مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی

• تداخلات دارویی و غذایی

- از مصرف همزمان این دارو و اسپری بینی آزلاستین اجتناب کنید.
- از مصرف همزمان این دارو و اسپری دهانی ایپراتروپیوم اجتناب کنید.
- از مصرف همزمان این دارو و کپسول استنشاقی تیوتروپیوم اجتناب کنید.
- از مصرف همزمان این دارو و داروهای پتاسیم سترات و پتاسیم کلراید اجتناب کنید.
- از مصرف همزمان این دارو و اسپری بینی اولوپاتادین اجتناب کنید.
- از مصرف همزمان این دارو و سایر ضد دردهای اپیوئیدی مانند اکسی کدون اجتناب کنید.
- مصرف همزمان این دارو و زولپیدم می تواند سبب افزایش اثر سرکوب سیستم عصبی شود و کاهش دوز این دارو با مشورت پزشک توصیه می شود. از مصرف همزمان این دو دارو در زمان خواب بپرهیزید.

• عوارض جانبی

- مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید. در صورت مشاهده واکنش‌های آلرژیک شدید (بثورات پوستی، خارش و تب، مشکل در تنفس، تورم گلو و زبان) مصرف قرصها را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید.
- از جمله عوارض جانبی شایع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- درد شکمی (مخصوصا در اطفال)، اسهال یا یبوست، خواب آلودگی، بی حالی، خستگی یا ضعف غیر عادی ، سرگیجه، سردرد، خشکی دهان، احتباس ادراری، تورم صورت و گردن، گرگرفتگی، درد در قفسه سینه و ضربان قلب تند یا نامنظم

• مسمومیت

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را به مرکز مسمومیتها انتقال دهید. علائم مصرف بیش از حد دارو عبارتند از: عدم ثبات در انجام کارها، تشنج، خواب آلودگی شدید، خشکی شدید دهان و بینی، احساس غش، برافروختگی یا قرمزی صورت، گشاد شدن مردمک چشم، تندی ضربان قلب، درد شکمی

• شرایط نگهداری :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

