

# گلیبیرا® ۵۰/۵۰۰

سیتاگلیپتین ۵۰ / متفورمین ۵۰۰

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

**دسته دارویی:** پایین آورنده قند خون

## موارد مصرف:

این دارو به عنوان خط دوم درمان در دیابت نوع ۲ در بیمارانی که با رژیم غذایی، ورزش و یا مصرف متفورمین و یا سیتاگلیپتین به تنهایی، کنترل قند خون مناسبی نداشته اند، به کار می رود.

همچنین این دارو برای کسانی که هر دو قرص متفورمین و سیتاگلیپتین را مصرف می کنند مناسب می باشد.

## موارد منع مصرف و احتیاط:

- حساسیت به سیتاگلیپتین، متفورمین و یا سایر اجزاء تشکیل دهنده دارو.  
- کتواسیدوز متابولیک مزمن و یا حاد و کتواسیدوز دیابتی

- نارسایی کلیوی در بیمارانی که کراتینین سرم آنها در مردان بیش از  $5/10 \text{ mg/dl}$  و در خانمها بیش از  $4/1 \text{ mg/dl}$  باشد.

## هشدارها:

- اسیدوز ناشی از اسید لاکتیک: ممکن است در اثر نارسایی کبدی و یا الکلیسم حاد و یا مزمن بوجود بیاید. در صورت ابتلا به اسیدوز مصرف دارو قطع شود.
- در بیمارانی که مواد حاجب ید دار مصرف کرده اند و یا تحت عمل جراحی که دریافت آب و غذا را محدود می کند قرار گرفته اند و یا بیمارانی که میزان آب بدن

آنها کم شده است (دهیدراته هستند) مصرف این دارو را قطع کنید. دهیدریشن ممکن است در اثر ابتلا به اسهال، استفراغ و یا تب نیز بروز کند.

- در صورت ابتلا به پانکراتیت (التهاب پانکراس) مصرف دارو قطع شود. علائم پانکراتیت شامل درد ادامه دار در ناحیه شکم که به پشت می زند و گاهی همرا با استفراغ می باشد.

- قبل از شروع درمان با این دارو و پس از شروع مصرف دارو سالی یک بار، عملکرد کلیوی بیمار بررسی شود.

- مصرف متفورمین سبب کمبود ویتامین B<sub>12</sub> می شود. لذا سالانه فاکتورهای خونی بیمار را بررسی کنید.

- چنانچه بیمار علاوه بر این دارو، داروهای ضد دیابت دیگری مصرف می کند، جهت جلوگیری از هایپوگلیسمی از دوز دارو کاسته شود.

- در صورت مشاهده هر گونه علائم حساسیت (شامل کهیر، تورم صورت، زبان، لب ها و گلو، اشکال در بلع و تنفس)، آنژیوادم و یا واکنشهای پوستی مانند سندرم استیون-جانسون مصرف دارو قطع شود.

## بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک متخصص مجاز است  
ترشح این دارو در شیر انسان به اثبات نرسیده است. لذا منافع دارو در برابر ضررهای احتمالی سنجیده شود.

## نکات قابل توصیه به بیمار:

- دارو را همراه غذا و یا بلافاصله پس از غذا و با یک وعده غذایی میل کنید.
- در طول درمان با این دارو، بیماران باید قند و HbA<sub>1c</sub> خون خود را به طور منظم اندازه گیری کنند.
- همراه با مصرف این دارو، رعایت رژیم غذایی، کنترل وزن و ورزش سبب بهبود کارایی درمانی دارو می شود.
- در صورت مشاهده علائم لاکتیک اسیدوز شامل احساس خستگی و ضعف، درد عضلات، اشکال در تنفس، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، اسهال، احساس سرما بخصوص در بازو و پاها، سرگیجه و ضربان نامنظم قلب، به بیمارستان مراجعه کنید.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگر چه تمام عوارض ذکر شده در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر به پزشک مراجعه کنید:

اسهال، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی، سردرد، هایپوگلاسیسمی (پایین آمدن قند خون)، گلودرد، آب ریزش بینی، تهوع و استفراغ، ضعف علائم هایپوگلاسیسمی: سردرد، ضعف، سرگیجه، خواب آلودگی، تحریک پذیری، گرسنگی، تپش قلب، تعریق، گیجی و عصبانیت.

## مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حداکثر مجاز، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

## شرایط نگهداری:

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.  
دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  
از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش  
تهران - ایران



• قبل از شروع درمان در صورت ابتلاء قبلی به پانکراتیت، سنگ کیسه صفرا و یا تری گلیسیرید بالای خون، نارسایی کبدی و کلیوی و بیماریهای قلبی (شامل CHF) پزشک را مطلع سازید.

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید. پزشک پزشک در صورت نیاز، دوز داروی شما را تغییر می دهد.  
• در صورت مصرف هر نوع دارو به خصوص سایر داروهای ضد دیابت، پزشک را مطلع سازید.  
• استرس، تب، تروما، عفونت و یا عمل جراحی، ممکن است میزان نیاز شما به این دارو را تغییر دهد. در صورت بروز مشکلات فوق، به پزشک خود مراجعه کنید.

## تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان سیتاگلیپتین / متفورمین با داروهای زیر سبب ایجاد تداخل دارویی شده و توصیه نمی گردد.  
• داروهای کاتیونی مانند دیگلوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کینین، تریامترن، تری متوپریم، ونکومایسین و آمیلوراید.  
• داروهای مهارکننده کربنیک آنهیدراز مانند توپیرامات، استازولامید، دی کلرفنامید و زونیسامید: مصرف همزمان این دارو ها با سیتاگلیپتین / متفورمین، ریسک بروز لاکتیک اسیدوز را بالا می برد.  
• داروهایی که سبب افزایش قند خون می شوند مانند تیازیدها، دیورتیکها، کورتیکواستروئیدها، فنوتیازین ها، داروهای تیروئیدی، استروژن، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنی تونین، نیکوتینیک اسید، مهار کننده های کانال های کلسیم و ایزونیازید: در صورت مصرف این دارو ها قند خون بیمار باید به طور مرتب چک شود.

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

میزان مصرف سیتاگلیپتین / متفورمین بسته به رژیم غذایی هر فرد و میزان اثر بخشی و تحمل بیمار در هر فرد متفاوت است و باید توسط پزشک تعیین شود ولی میزان دوز مصرفی نباید از ۱۰۰ میلی گرم سیتاگلیپتین / ۲۰۰۰ میلی گرم متفورمین بیشتر شود  
دوز ابتدایی در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد دیابت هستند یک قرص دو بار در روز می باشد.