

- استفاده طولانی مدت از این دارو ممکن است منجر به فشار خون بالا و یا گلوکوم، آسیب به عصب بینایی، کاهش بینایی، نقص میدان بینایی و تشکیل آب مروارید زیر کپسولی خلفی شود. در بیمارانی که به مدت طولانی تحت درمان با دگزامتازون چشمی قرار می‌گیرند، فشار داخل چشم و عدسی باید به طور مرتب و مکرر بررسی شود.

- در بیماران مبتلا به خشکی چشم و در بیمارانی که ممکن است قرنیه آنها در معرض خطر باشد، با احتیاط مصرف شود.

- سندرم کوشینگ و یا سرکوب آدرنال در پی جذب سیستمیک قطره دگزامتازون چشمی، ممکن است پس از درمان فشرده یا طولانی مدت مداوم در بیماران مستعد، از جمله کودکان و بیمارانی که با مهارکننده‌های CYP3A4 درمان می‌شوند، رخ دهد.

- در صورت داشتن هرگونه بیماری زمینه ای چشمی، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

- در کودکان، به دلیل احتمال سرکوب آدرنال، باید از درمان طولانی مدت و مداوم با کورتیکواستروئید اجتناب شود.

- به دلیل افزایش خطر عفونت، نباید در طول درمان با قطره چشمی دگزامتازون از لنزهای تماسی استفاده شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری، فقط با تشخیص پزشک معالج مجاز میباشد.

• نحوه مصرف:

پیش از مصرف دارو دستهای خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.

1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.
3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیا خودداری نمایید.
4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.
5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.

- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف 15 دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• دسته دارویی :

کورتیکواستروئید موضعی

• مکانیسم اثر:

این دارو با مهار فسفولیپاز A2 ، از تولید موادی که واسطه التهاب هستند، مانند پروستاگلاندین‌ها، جلوگیری می‌کنند.

• موارد مصرف:

- درمان التهاب و درد چشمی پس از جراحی .
- درمان بیماری‌هایی التهابی مانند: التهاب ملتحمه آلرژیک، التهاب ملتحمه و جسم مژگانی.

• موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً واکنش نامطلوب مشکوک به بنزالکونیوم کلراید داشته‌اند که منجر به قطع مصرف شده است.

- در افرادی که به ماده موثره حساسیت دارند.

- مصرف در هرپس سیمپلکس و سایر بیماری‌های ویروسی قرنیه و ملتحمه، بیماری‌های قارچی، سل چشمی، عفونت‌های چرکی درمان نشده، و بیمارانی که سابقه کراتیت حاد اپیتلیال هرپس سیمپلکس دارند، منع مصرف دارد.

• هشدارها:

- در بیماری‌هایی که باعث نازک شدن قرنیه یا صلبیه می‌شوند با احتیاط مصرف شود.

- این فرآورده حاوی فسفات می‌باشد و در صورت مصرف موضعی ممکن است منجر به رسوب قرنیه یا کدورت قرنیه شود

- این محصول حاوی بنزالکونیوم کلراید است و ممکن است جذب شده و باعث تحریک موضعی خفیف و تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شود؛ قبل از تجویز، لنزها را خارج کرده و 15 دقیقه قبل از قرار دادن مجدد صبر کنید.

- در صورت مشاهده واکنش‌های آلرژیک، درمان با باید قطع شود.

- کورتیکواستروئیدهای موضعی نباید بیش از یک هفته استفاده شوند مگر تحت نظارت چشم پزشک.

- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می‌شود، هر دارو را حداقل ۵ دقیقه با فاصله استفاده کنید.



• مقدار مصرف :

- دوز معمول در بزرگسالان، از جمله سالمندان، ۱ قطره، ۴ تا ۶ بار در روز است.
- استفاده از قطره چشمی دگزامتازون در کودکان و نوجوانان باید محدود شود.

• تداخلات دارویی:

- آنتی کولینرژیک‌ها، به ویژه آتروپین
- خطر رسوب قرنیه یا کدورت قرنیه در بیمارانی که قرنیه آنها آسیب دیده و داروهای چشمی حاوی فسفات دیگری را به صورت چند دارویی دریافت می‌کنند، ممکن است رخ دهد.
- اثربخشی درمانی دگزامتازون ممکن است توسط فنی توئین، فنوباربیتون، افدرین و ریفامپین کاهش یابد.
- مهارکننده‌های CYP3A4 ممکن است کلیرانس دگزامتازون را کاهش دهند که منجر به افزایش اثرات و سرکوب آدرنال می‌شود در نتیجه از مصرف همزمان این دو دارو باید اجتناب گردد.

• عوارض جانبی:

- اختلالات چشمی: سوزش و خارش و ناراحتی چشمی، افزایش فشار داخل چشم.
- اختلالات غدد درون ریز: سرکوب آدرنال و سندروم کوشینگ
- علائم و واکنش‌های آلرژیک
- کلسیفیکاسیون قرنیه

• نگهداری:

- در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
- 30 روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

