

قطره چشمی دورزولامید 2 درصد

- در بیمارانی که سابقه سنگ کلیه دارند ممکن است در هنگام استفاده از دورزولامید در معرض خطر ابتلا مجدد به سنگ کلیه باشند.

- در صورت مشاهده واکنش‌های آلرژیک (مانند ورم ملتحمه و واکنش‌های پلک چشم)، قطع درمان باید در نظر گرفته شود.

- به دلیل احتمال ایجاد ادم قرنیه و اختلالات جبران ناپذیر قرنیه، در بیمارانی که سابقه نقص مزمن قرنیه و یا جراحی داخل چشمی دارند، با احتیاط مصرف شود.

- در صورت داشتن هرگونه بیماری زمینه ای چشمی، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت استفاده طولانی مدت، بیماران باید تحت نظر باشند.

- در بیماران مبتلا به خشکی چشم و در بیماران دارای مشکلات قرنیه، با احتیاط مصرف شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری: دورزولامید نباید در دوران بارداری استفاده شود و داده‌های محدودی در مورد استفاده از آن در زنان باردار وجود دارد.

شیردهی: استفاده از آن در دوران شیردهی فقط با تشخیص پزشک معالج مجاز می باشد.

• نحوه مصرف:

پیش از مصرف دارو دستهای خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.

1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.

3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیاء خودداری نمایید.

4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.

5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.

- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف 15 دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.

- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می‌شود، هر دارو را حداقل 10 دقیقه با فاصله استفاده کنید.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• دسته دارویی :

داروی ضد گلوکوم، مهارکننده آنزیم کربنیک انهیدراز.

• مکانیسم اثر:

دورزولامید با مهار آنزیم کربنیک انهیدراز در زوائد جسم مژگانی چشم باعث کاهش ترشح زلالیه می شود و در نتیجه آن فشار چشم کاهش می یابد.

• موارد مصرف:

کاهش فشار داخل چشمی بالا ، در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه با، گلوکوم شبه اکسفولیاتیو یا فشار خون بالای چشمی.

• موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً واکنش نامطلوب مشکوک به بنزالکونیوم کلراید داشته‌اند که منجر به قطع مصرف شده است.

- در افرادی که به دورزولامید حساسیت دارند.

- در بیماران مبتلا به اختلال شدید کلیوی ($CrCl < 30$ میلی لیتر در دقیقه) یا مبتلا به اسیدوز هیپرکلورمیک.


• هشدارها:

- در بیماران مبتلا به اختلال کبدی

- در بیماران مبتلا به گلوکوم حاد زاویه بسته

- این محصول حاوی بنزالکونیوم کلراید است و ممکن است جذب شده و باعث تحریک موضعی خفیف و تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شود؛ قبل از تجویز، لنزها را خارج کرده و 15 دقیقه قبل از قرار دادن مجدد صبر کنید.

- در صورت بروز علائم واکنش‌های جدی یا حساسیت بیش از حد، مصرف این دارو قطع گردد (به دلیل وجود سولفونامید و احتمال بروز واکنش نامطلوب مانند سندرم استیونز-جانسون)



• مقدار مصرف :

- در صورت استفاده به تنهایی (مونوتراپی): یک قطره، هر 8 ساعت، در هر چشم چکانده شود.
- در صورت استفاده به عنوان درمان کمکی با یک بتابلایزر چشمی: یک قطره، هر 12 ساعت، در هر چشم چکانده شود.
- نکته: هنگام جایگزینی دورزولامید با یک داروی ضد گلوکوم چشمی دیگر، 1 روز پس از قطع آن، مصرف دورزولامید را شروع نمایید.

• تداخلات دارویی:

- تداخل دارویی خاصی در این دارو مشاهده نشده است.

• عوارض جانبی:

- اختلالات سیستم عصبی: سردرد
- اختلالات چشمی: کراتیت، اشک ریزش، ورم ملتحمه، التهاب پلک، خارش چشم، سوزش پلک، تاری دید.
- اختلالات گوارشی: تهوع و احساس تلخی در دهان.
- اختلالات عمومی: خستگی و ضعف.

• نگهداری:

- در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
- 30 روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

