


- اثرات سمی برگشتناپذیر ممکن است در اثر تماس مستقیم جنتامایسین با گوش میانی و داخلی ایجاد شود. مزایای درمان با جنتامایسین باید در مقابل خطر عفونت ناشی از کاهش شنوایی در نظر گرفته شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ایمنی مصرف جنتامایسین در دوران بارداری و شیردهی مشخص نشده است. جنتامایسین فقط در صورت لزوم و پس از ارزیابی دقیق خطرات و مزایای احتمالی، باید در دوران بارداری یا شیردهی مصرف شود.

• نحوه مصرف:

- پیش از مصرف دارو دستهای خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.
- 1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
- 2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.
- 3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیا خودداری نمایید.
- 4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.
- 5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.
- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف 15 دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.
- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می‌شود، هر دارو را حداقل 5 دقیقه با فاصله استفاده کنید.



• مقدار مصرف:

- 2 تا 3 قطره، 3 تا 4 مرتبه در روز یا در صورت نیاز با فواصل بیشتر، در گوش آسیب دیده بچکانید.

• تداخلات دارویی:

- اتاکرینیک اسید و فروزماید
- آمفوتریسین B، سیس پلاتین و سیکلوسپورین و سفالوسپورین‌ها

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• دسته دارویی:

آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی

• مکانیسم اثر:

این دارو با اتصال به ریبوزوم باکتری، در سنتز پروتئین باکتری اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه غشای سلولی باکتری دچار نقص و اختلال در عملکرد می‌شود.

• موارد مصرف:

درمان عفونت باکتریایی چشم مانند التهاب ملتحمه، التهاب قرنیه، زخم قرنیه، التهاب پلک و ملتحمه، التهاب حاد غدد میومین و عفونت کیسه اشکی که ناشی از طیف وسیعی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، استفاده می‌شود.

• موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً واکنش نامطلوب مشکوک به بنزالکونیوم کلراید داشته‌اند که منجر به قطع مصرف شده است.
- در بیمارانی که آلرژی شناخته شده به جنتامایسین و سایر آمینوگلیکوزیدها دارند
- در میاستنی گراویس و شرایط مرتبط با آن
- پارگی پرده گوش

• هشدارها:

- از مصرف طولانی مدت خودداری کنید. مصرف طولانی مدت ممکن است منجر به حساسیت پوستی و ظهور ارگانیسم‌های مقاوم شود. حساسیت متقاطع با سایر آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی ممکن است رخ دهد.
- این محصول حاوی بنزالکونیوم کلراید است و ممکن است جذب شده و باعث تحریک موضعی خفیف و تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شود؛ قبل از تجویز، لنزها را خارج کرده و 15 دقیقه قبل از قرار دادن مجدد صبر کنید.
- قبل از تجویز این دارو، وضعیت پرده گوش باید همیشه بررسی شود. در صورت عدم تضمین سلامت پرده گوش، نباید از این دارو استفاده شود.

• عوارض جانبی:

- اختلالات چشمی: سوزش و خارش، گزگز چشم و تاری دید.
- اختلالات گوش: حساسیت موضعی، اتوتوکسیسیته اختلال دهلیزی؛ کاهش شنوایی
- اختلالات پوستی و بافت زیر جلدی: احساس سوزش، گزش، خارش، درماتیت.

• نگهداری:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، درون جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
30 روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.
در صورت مشاهده کدورت یا تغییر رنگ محصول از مصرف آن خودداری شود.
دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

