

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و با سابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

نفازولین

قطره استریل چشمی نفازولین 0/1 درصد (10 میلی لیتر):

هر میلی لیتر حاوی 1 میلی گرم نفازولین هیدروکلراید می‌باشد.

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قطره چشمی نفازولین هیدروکلراید چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قطره چشمی نفازولین هیدروکلراید باید بدانید
3. نحوه استفاده از قطره چشمی نفازولین هیدروکلراید
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قطره چشمی نفازولین هیدروکلراید

1. نفازولین هیدروکلراید چیست و چه کاربردی دارد؟

نفازولین یک داروی ضد احتقان و ضد حساسیت است.

1.1. موارد مصرف

برای تسکین موقت قرمزی چشم ناشی از سوزش‌های جزئی چشم به کار می‌رود.

2. اطلاعاتی که لازم است قبل از شروع مصرف بدانید:

2.1. موارد منع مصرف

- حساسیت به آب هماملیس و نفازولین
- در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه بسته
- در افراد دارای بیماری چشمی جدی یا سابقه جراحی چشم
- در هنگام مصرف مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز یا در مدت ۱۴ روز پس از قطع مصرف این دارو

2.2. هشدار و احتیاط مصرف

- اگر تحت درمان فشار خون بالا، افسردگی، بیماری قلبی، تصلب شرایین، دیابت یا افزایش فعالیت تیروئید هستید، قبل از استفاده از قطره‌ها با پزشک خود مشورت کنید زیرا نفازولین ممکن است انقباض عروق را تشدید کند. به همین دلیل، این محصول نباید طولانی مدت استفاده شود.
- این دارو حاوی بنزالکونیوم کلراید می‌باشد و ممکن است باعث تحریک موضعی خفیف شود.
- بنزالکونیوم کلراید ممکن است توسط لنزهای تماسی نرم جذب شود و منجر به تغییر رنگ لنز تماسی شود؛ بنابراین پیش از استفاده از این قطره باید لنزهای تماسی را خارج کرده و 15 دقیقه بعد مجدداً استفاده نمائید.
- استفاده مداوم از این محصول ممکن است قرمزی چشم را افزایش دهد.
- استفاده از نفازولین در چشم ممکن است باعث آزاد شدن گرانول‌های رنگدانه از عنبیه شود، به خصوص هنگامی که در دوزهای بالا به بیماران مسن داده شود.
- اگر دچار درد چشم، تغییر در بینایی یا قرمزی مداوم چشم شدید، یا در صورت بدتر شدن وضعیت یا ادامه یافتن بیش از 24 ساعت، با پزشک مشورت کنید.
- اگر رنگ محلول تغییر کرد یا کدر شد، از آن استفاده نکنید.

2.3. بارداری و شیردهی

ایمنی قطره چشم نفازولین در دوران بارداری و شیردهی مشخص نشده است.

2.4. تداخلات دارویی

- ممکن است با سایر داروهای موضعی اتونومیک مورد استفاده در درمان گلوکوم تداخل داشته باشد.

- ممکن است اثر ضد فشار خون داروهای مورد استفاده در درمان فشار خون بالا را معکوس کند.
- ممکن است با مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز تداخل داشته باشد و نباید توسط بیمارانی که چنین درمانی دریافت می‌کنند یا ظرف ۱۴ روز پس از قطع درمان استفاده شود.
- ممکن است خطر آریتمی در بیمارانی که گلیکوزیدهای قلبی، کینیدین یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای دریافت می‌کنند، افزایش یابد.

3. نحوه استفاده

3.1 روش مصرف

- پیش از مصرف دارو دستهای خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.
1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
 2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.
 3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیا خودداری نمایید.
 4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت ۱ تا ۲ دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.
 5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.



- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف ۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.
- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می‌شود، هر دارو را حداقل ۵ دقیقه با فاصله استفاده کنید.

3.2 دوز مصرف

- بزرگسالان، کودکان بالای ۱۲ سال و سالمندان:
- به آرامی یک تا دو قطره را در گوشه هر چشم بچکانید. بیش از ۴ بار در روز نباشد.
- ✓ در کودکان زیر ۱۲ سال استفاده نشود.

4. عوارض جانبی

- اختلالات سیستم ایمنی: حساسیت بیش از حد
- اختلالات سیستم عصبی: سردرد، سرگیجه
- اختلالات چشمی: سوزش چشم، درد چشم، پرخونی چشم

- اختلالات گوارشی: حالت تهوع

5. شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، درون جعبه نگهداری و از نور و یخ زدگی محافظت شود.
یک ماه پس از باز شدن در ظرف برای اولین مرتبه، باقیمانده دارو را دور بریزید.
دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.