

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و با سابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

نفازولین

قطره بینی نفازولین 0/05 درصد (10 میلی لیتر): هر میلی لیتر حاوی 0/5 میلی گرم نفازولین هیدروکلراید می‌باشد.

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قطره بینی نفازولین هیدروکلراید چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قطره بینی نفازولین هیدروکلراید باید بدانید
3. نحوه استفاده از قطره بینی نفازولین هیدروکلراید
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قطره بینی نفازولین هیدروکلراید

1. نفازولین هیدروکلراید چیست و چه کاربردی دارد؟

نفازولین یک داروی ضد احتقان و ضد حساسیت است.

1.1. موارد مصرف

نفازولین بینی یک ضد احتقان است برای تسکین موقت گرفتگی بینی ناشی از سرماخوردگی، تب یونجه یا سینوزیت کاربرد دارد.

2. اطلاعاتی که لازم است قبل از شروع مصرف بدانید:

2.1. موارد منع مصرف

- حساسیت به آب هاماملیس و نفازولین
- در هنگام مصرف مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز یا ظرف ۱۴ روز پس از قطع این دارو استفاده نشود.

2.2. هشدار و احتیاط مصرف

- بیشتر از مقدار توصیه شده استفاده نکنید.
- این محصول ممکن است باعث ناراحتی موقت مانند سوزش، گزش، عطسه یا افزایش ترشحات بینی شود.
- استفاده بیش از یک نفر از یک ظرف ممکن است باعث انتشار عفونت شود.
- از این محصول بیش از 3 روز استفاده نکنید. فقط طبق دستورالعمل استفاده کنید. استفاده مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث عود یا بدتر شدن گرفتگی بینی شود. در صورت تداوم علائم، با پزشک مشورت کنید.
- در صورت ابتلا به بیماری قلبی، فشار خون بالا، بیماری تیروئید، دیابت یا مشکل در ادرار کردن به دلیل بزرگ شدن غده پروستات، از این محصول استفاده نکنید مگر با تجویز پزشک معالج.
- هنگام استفاده از این محصول، از تماس با چشم خودداری کنید.

2.3. بارداری و شیردهی

ایمنی قطره بینی نفازولین در دوران بارداری و شیردهی مشخص نشده است.

2.4. تداخلات دارویی

ممکن است با مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز تداخل داشته باشد و نباید توسط بیمارانی که چنین درمانی دریافت می‌کنند یا ظرف ۱۴ روز پس از قطع درمان استفاده شود.

3. نحوه استفاده

3.1. روش مصرف

- 1- دستان خود را بشوید و به آرامی بینی خود را پاک کنید.
- 2- قطره‌های بینی را به آرامی تکان دهید. درب را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا آن را بردارید.

3- به پشت دراز بکشید، سرتان را کمی بالاتر از تخت قرار دهید. سر خود را به عقب خم کنید، به طوری که چانه‌تان به سمت بالا باشد.

4- به طور عادی از طریق دهان نفس بکشید و تعداد قطره‌های تجویز شده را در هر سوراخ بینی بریزید.

5- پس از ریختن قطره‌ها، دو دقیقه در این حالت دراز بکشید.

6- پس از ریختن قطره‌ها در هر دو سوراخ بینی، نازل را تمیز کرده و درب را دوباره بگذارید.

✓ از تماس نوک قطره‌چکان با بینی یا سایر سطوح خودداری کنید تا از آلودگی فرآورده جلوگیری شود.

3.2. دوز مصرف

بزرگسالان، کودکان بالای ۱۲ سال و سالمندان:

1 یا ۲ قطره از محلول 0/05 درصد، هر ۶ ساعت در هر سوراخ بینی چکانده شود. (حداکثر مدت زمان مصرف ۳ روز می باشد)

✓ در کودکان زیر ۱۲ سال استفاده نشود.

4. عوارض جانبی

- سوزش یا گزش در بینی
- عطسه
- خشکی بینی
- واکنش‌های آلرژیک شدید: مشکلات تنفسی یا خس خس سینه، تپش قلب، تب یا احساس ناخوشی عمومی، تورم غدد لنفاوی، تورم صورت، لب‌ها، دهان، زبان یا گلو، مشکل در بلع یا گرفتگی گلو، خارش، بثورات پوستی یا برآمدگی‌های قرمز کم‌رنگ روی پوست به نام کهیر، حالت تهوع یا استفراغ، سرگیجه، احساس سبکی سر یا غش، گرفتگی معده، درد مفاصل

5. شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، درون جعبه نگهداری و از نور و یخ زدگی محافظت شود.

یک ماه پس از باز شدن در ظرف برای اولین مرتبه، باقیمانده دارو را دور بریزید.

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.