

آتورواستاتین

در دوزهای ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

آتورواستاتین متعلق به گروهی از داروها به نام آستاتین است که تنظیم کننده چربی هستند. آتورواستاتین برای کاهش کلسترول و تری گلیسرید در خون استفاده می شود. همچنین اگر در معرض خطر بیماری های قلبی هستید، آتورواستاتین می تواند برای کاهش چنین خطری نیز استفاده شود حتی اگر سطح کلسترول شما نرمال باشد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دوز شروع معمول آتورواستاتین ۱۰ میلی گرم یک بار در روز در بزرگسالان و کودکان ۱۰ سال و بالاتر است.

این دوز ممکن است در صورت لزوم در فواصل ۴ هفته یا بیشتر توسط پزشک افزایش یابد تا زمانی که به مقدار مورد نیاز دست یابد. حداکثر دوز آتورواستاتین ۸۰ میلی گرم یک بار در روز است.

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک یا داروساز به شما گفته است مصرف کنید.

هشدارها

قبل از مصرف آتورواستاتین با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید:

- اگر نارسایی شدید تنفسی دارید.
- اگر در ۷ روز گذشته دارویی به نام فوزیدیک اسید(دارویی برای عفونت باکتریایی) مصرف کرده اید. ترکیب فوزیدیک اسید و آتورواستاتین می تواند منجر به مشکلات جدی عضلانی (رابدومیولیز) شود.
- اگر قبلاً سکته مغزی همراه با خونریزی در مغز داشته اید.
- اگر مشکلات کلیوی دارید.
- اگر غده تیروئید کم کار دارید (کم کاری تیروئید).
- اگر دردهای عضلانی مکرر یا غیرقابل توضیح و یا سابقه شخصی یا خانوادگی درد عضلانی داشته اید.
- اگر در طول درمان با سایر داروهای کاهنده چربی، مشکلات عضلانی داشته اید.
- اگر مقدار زیادی از فرآورده های حاوی الکل مصرف می کنید.
- اگر سابقه بیماری کبدی دارید.
- اگر بیش از ۷۰ سال سن دارید.
- اگر میاستنی(بیماری با ضعف عمومی عضلانی) یا میاستنی چشمی (بیماری که باعث ضعف عضله چشم می شود) دارید زیرا استاتین ها گاهی اوقات ممکن است شرایط را تشدید کنند یا منجر به بروز آن شوند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

پیش از مصرف این فرآورده در هنگام بارداری و شیردهی حتما با پزشک خود مشورت کنید. (این فرآورده در بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.)

موارد منع مصرف

- اگر به آتورواستاتین یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.
- اگر بیماری ای دارید که بر کبد تأثیر می گذارد یا قبلاً داشته اید.
- اگر آزمایش خون غیر طبیعی غیرقابل توضیحی برای عملکرد کبد داشته اید.
- اگر خانمی در سن باروری هستید و از روش های پیشگیری قابل اعتماد استفاده نمی کنید.
- اگر باردار هستید و یا در تلاش برای باردار شدن هستید.
- اگر در دوران شیردهی هستید.

تداخلات دارویی و غذایی

اگر داروی دیگری مصرف می کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

برخی داروها ممکن است اثر آتورواستاتین را تغییر دهند یا اثر آنها توسط آتورواستاتین تغییر پیدا کند. این نوع تداخل می تواند اثر یک یا هر دو دارو را کاهش دهد و یا می تواند شدت عوارض جانبی مانند رابدومیولیز را افزایش دهد.

- داروهایی که برای عملکرد سیستم ایمنی استفاده می شوند، به عنوان مثال. سیکلوسپورین
- برخی از آنتی بیوتیک ها یا داروهای ضد قارچ، به عنوان مثال. اریترومايسين، کلاریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول، وریکونازول، فلوکونازول، ریفامپین، فوزیدیک اسید
- داروهای دیگر برای تنظیم سطح چربی، مانند جم فیبروزیل، سایر فیبرات ها، کلستپول
- برخی از مسدود کننده های کانال کلسیم که برای آنژین صدری یا فشار خون بالا استفاده می شوند، مانند املودیپین، دیلتیازم و یا داروهایی که برای تنظیم ریتم قلب استفاده میشوند مانند دیگوکسین، وراپامیل، آمیودارون
- داروهای مورد استفاده در درمان HIV مانند ریتوناویر، لوپیناویر، آتازاناویر و...
- سایر داروهایی که دارای تداخل با آتورواستاتین هستند عبارتند از ازیتمایب، وارفارین، داروهای ضد بارداری خوراکی، سایمتیدین، کلشی سین، ریفامپین و آنتی اسیدها
- St John’s Wort
- آب گریپ فروت

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض شایع:

- التهاب مجاری بینی، درد در گلو، خونریزی بینی
- واکنش های آلرژیک
- افزایش سطح قند خون (اگر دیابت دارید، نظارت دقیق بر سطح قند خون داشته باشید)، افزایش کراتین کیناز خون
- سردرد
- تهوع، یبوست، نفخ، سوء هاضمه، اسهال
- درد مفاصل، درد عضلانی و کمر درد
- نتایج آزمایش خون که نشان می دهد عملکرد کبد شما می تواند غیر طبیعی شود.

عوارض ناشایع:

- بی اشتها، افزایش وزن، کاهش سطح قند خون (اگر دیابت دارید، نظارت دقیق بر سطح قند خون داشته باشید)
- دیدن کابوس، بی خوابی
- سرگیجه، بی حسی یا سوزن سوزن شدن در انگشتان دست و پا، کاهش احساس درد یا لمس، تغییر در حس چشایی، از دست دادن حافظه
- تاری دید
- زنگ زدن در گوش و/یا سر
- استفراغ، آروغ زدن، درد شکم ، پانکراتیت (التهاب پانکراس که منجر به درد معده می شود).
- هپاتیت (التهاب کبد)
- بثورات پوستی، خارش، کهیر، ریزش مو
- گردن درد، خستگی عضلانی
- خستگی، احساس ناخوشی، ضعف، درد قفسه سینه، تورم به ویژه در مچ پا (ادم)، افزایش دما
- آزمایش ادرار که برای گلبول های سفید خون مثبت است.

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتیر از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران – ایران