

• موارد منع مصرف

حساسیت به دارو، نارسایی کبد، نارسایی کلیوی، نارسایی سیستم تنفسی، شیردهی، اعتیاد به الکل

• موارد مصرف

• تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف همزمان متادون با داروهای آرام بخش مانند بنزودیازپین ها (دیازپام، الپرازولام و ...) یا داروهایی مرتبط با آن، خطر خواب آلودگی، مشکلات تنفسی و کما را افزایش می دهند که کشنده است.
- مصرف همزمان متادون با داروهای ضد افسردگی نظیر ستالوپرام، دولوکستین، اس سیتالوپرام، فلوکستین، ونلافاکسین، آمی تریپتیلین و... موجب افزایش ظهور عوارض جانبی این داروها می شود.
- مصرف همزمان این دارو با نالتروکسان موجب بروز سندرم قطع مصرف می شود.
- حین مصرف این دارو از مصرف فرآورده های حاوی الکل خودداری کنید.

• عوارض جانبی

مصرف هر دارو می تواند در کنار اثرات مفید، عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد.

در صورتیکه هر یک از عوارض زیر رخ داد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

تهوع، استفراغ، یبوست، تعریق بیش از حد، تنگ شدن مردمک چشم، اسهال، عضلاتی، خشکی دهان و چشم ها، ضعف عضلانی، خواب آلودگی، اضطراب، توهم، سردرد، راش پوستی، پایین بودن دمای بدن، بالا بودن پرولاکتین خون، افت قند خون

• مسمومیت

مصرف بیش از اندازه این دارو خطرناک است و می تواند کشنده باشد، لذا در صورت مصرف تصادفی بیش از مقادیر تجویز شده ، سریعاً همراه با دارو به بیمارستان مراجعه کنید.

• شرایط نگهداری :

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



این دارو متعلق به دسته ضد دردهای اپیوئیدی می باشد که جهت درمان اعتیاد و کمک به کاهش علائم قطع مصرف ناشی از درمان اعتیاد موثر است و فقط زیر نظر پزشک باید مصرف شود.

• راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به متادون یا داروهای مشابه
- در صورت سابقه فشار خون پایین
- در صورت سابقه کم کاری تیروئید
- در صورت سابقه آسیب به سر یا صدمات مغزی
- در صورت سابقه تشنج یا صرع
- در صورت سابقه مشکلات قلبی
- در صورت ابتلا به بیماری های مزمن تنفسی
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و کلیوی
- در صورت اعتیاد به الکل
- در صورت ابتلا به بیماری های غده فوق کلیه
- در صورت ابتلا به بیماری های روده ای مانند کولیت اولسراتیو
- در صورت بارداری و شیردهی

• نحوه مصرف

مقدار و نحوه مصرف این دارو با توجه به شرایط بیمار با تجویز پزشک صورت می گیرد.

همیشه این دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز خود مصرف کنید. به این علت که شما می توانید به قرص متادون وابسته شوید.

هرگز مصرف دارو را به صورت ناگهانی قطع نکنید.

• هشدارها

- این دارو ممکن است باعث وابستگی شود و حتماً باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری کنید.
- این دارو به ویژه در دوزهای بالا تاثیر منفی بر روی عملکرد قلب دارد و منجر به آسیب شدید قلبی می شود، لذا در صورت داشتن سابقه بیماری قلبی به پزشک خود اطلاع دهید.
- مصرف این دارو به دلیل ضد درد بودن ممکن است منجر به پوشش علائم بعضی از بیماری ها شود، لذا حین معاینات، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- مصرف این دارو موجب خواب آلودگی می شود، لذا حین مصرف از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.
- در صورتیکه هر یک از علائم زیر رخ داد سریعاً دارو را قطع نموده و به پزشک مراجعه نمایید.
- ✓ مشکلات قلبی و مشاهده هرگونه تغییری در ضربان قلب مانند سریعتر شدن ضربان قلب، کاهش ضربان قلب و ...
- ✓ سختی در تنفس به ویژه اگر تنفس شما کند و کم عمق می شود.
- ✓ گیجی و خواب آلودگی