

متادون هیدروکلراید

شریت و قطره خوراکی

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

متادون هیدروکلراید ۲۵ میلی گرم

موارد مصرف

این دارو متعلق به دسته ضد دردهای اپیوئیدی می باشد که جهت درمان اعتیاد و کمک به کاهش علائم قطع مصرف ناشی از درمان اعتیاد موثر است و فقط زیر نظر پزشک باید مصرف شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به متادون یا داروهای مشابه
- در صورت اعتیاد به الکل
- در صورت سابقه فشار خون پایین
- در صورت سابقه کم کاری تیروئید
- در صورت سابقه آسیب به سر یا صدمات مغزی
- در صورت سابقه تشنج یا صرع
- در صورت سابقه مشکلات قلبی
- در صورت ابتلا به بیماری های مزمن تنفسی
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و کلیوی
- در صورت ابتلا به بیماری های غده فوق کلیه
- در صورت ابتلا به بیماری های روده ای مانند کولیت اولسراتیو
- در صورت بارداری و شیردهی

نحوه مصرف

مقدار و نحوه مصرف این دارو با توجه به شرایط بیمار با تجویز پزشک صورت می گیرد.

همیشه این دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز خود مصرف کنید. به این علت که شما می توانید به محلول خوراکی متادون وابسته شوید.

هرگز مصرف دارو را به صورت ناگهانی قطع نکنید.

تحمل، وابستگی و اعتیاد

استفاده مکرر از متادون می تواند منجر به کاهش اثربخشی دارو شود. استفاده مکرر از محلول خوراکی متادون همچنین می تواند منجر به وابستگی، سوءمصرف و اعتیاد شود که ممکن است منجر به مصرف بیش از حد شود.

در موارد زیر خطر وابستگی یا اعتیاد به متادون بیشتر می شود:

- اعتیاد به الکل

- اعتیاد به سیگار

- در افراد با مشکلات خلقی (افسردگی، اضطراب یا سایر بیماری های اعصاب

و روان)

علائم ترک

علائم ترک می تواند شامل بی قراری، مشکل در خواب، تحریک پذیری، آشفتگی، اضطراب، احساس بیماری، اسهال، از دست دادن اشتها، لرزش، رعشه یا تعریق باشد. پزشک شما قبل از قطع دارو، در مورد نحوه کاهش تدریجی دوز دارو با شما صحبت خواهد کرد. مهم است که مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید زیرا احتمال بروز علائم ترک بیشتر خواهد بود.

موارد منع مصرف

- حساسیت به دارو
- نارسایی کبدی و کلیوی
- نارسایی سیستم تنفسی،
- شیردهی
- اعتیاد به الکل

محلول خوراکی متادون برای کودکان مناسب نیست.

جهت پیشگیری از بروز صدمات جبران ناپذیر، دارو را

جدا دور از دسترس و دید کودکان و ترجیحاً در قفسه

قفل دار نگهداری نمایید.

هشدارها

- این دارو ممکن است باعث وابستگی شود و حتماً باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری کنید.
- این دارو به ویژه در دوزهای بالا تاثیر منفی بر روی عملکرد قلب دارد و منجر به آسیب شدید قلبی می شود، لذا در صورت داشتن سابقه بیماری قلبی به پزشک خود اطلاع دهید.
- مصرف این دارو به دلیل ضد درد بودن ممکن است منجر به پوشتش علائم بعضی از بیماری ها شود، لذا حین معاینات، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- مصرف این دارو موجب خواب آلودگی می شود، لذا حین مصرف از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

▪ در صورتیکه هر یک از علائم زیر رخ داد سریعاً دارو را قطع نموده و به پزشک مراجعه نمایید.

- ✓ مشکلات قلبی و مشاهده هرگونه تغییری در ضربان قلب مانند سریعتر شدن ضربان قلب، کاهش ضربان قلب و ...
- ✓ سختی در تنفس به ویژه اگر تنفس شما کند و کم عمق می شود.

✓ گیجی و خواب آلودگی

تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف همزمان متادون با داروهای آرام بخش مانند بنزودیازپین ها (دیازپام، الپرازولام و ...) یا داروهایی مرتبط با آن، خطر خواب آلودگی، مشکلات تنفسی و کما را افزایش می دهند که کشنده است.
- مصرف همزمان متادون با داروهای ضد افسردگی نظیر ستالوپرام، دولوکستین، اس سیتالوپرام، فلوکستین، ونلافاکسین، آمی تریپتیلین و... موجب افزایش ظهور عوارض جانبی این داروها می شود.
- مصرف همزمان این دارو با نالتروکسان موجب بروز سندرم قطع مصرف می شود.
- حین مصرف این دارو از مصرف فرآورده های حاوی الکل خودداری کنید.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو می تواند در کنار اثرات مفید، عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد.

در صورتیکه هر یک از عوارض زیر رخ داد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- تهوع، استفراغ، یبوست، تعریق بیش از حد، تنگ شدن مردمک چشم، اسپاسم عضلاتی، خشکی دهان و چشم ها، ضعف عضلاتی، خواب آلودگی، اضطراب، توهم، سردرد، راش پوستی، پایین بودن دمای بدن، بالا بودن پرولاکتین خون، افت قند خون
- مصرف طولانی مدت ممکن است باعث کاهش سطح هورمون های جنسی و افزایش سطح هورمون پرولاکتین شود. در صورت بروز علائمی مانند کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی یا قطع قاعدگی (آمنوره) با پزشک خود تماس بگیرید.
- متادون می تواند باعث اختلالات تنفسی مرتبط با خواب مانند آپنه خواب (مکت تنفسی در طول خواب) و هیپوکسمی مرتبط با خواب (سطح پایین اکسیژن در خون) شود. این علائم می تواند شامل بیدار شدن در شب به

دلیل تنگی نفس، مشکل در حفظ خواب یا خواب آلودگی بیش از حد در طول روز باشد. در صورت مشاهده این علائم با پزشک خود تماس بگیرید.

مسمومیت

متادون دارویی با سمیت بالا می باشد. در کودکان دوز ایجاد مسمومیت کمتر بوده و مصرف حتی یک قرص یا یک قاشق شربت نیز می تواند خطرناک باشد. در صورت مشاهده مصرف، کودک را سریعاً به پزشک ارجاع دهید. به یاد داشته باشید که اکثر مسمومیت های ناشی از متادون به آرامی و تدریجی ایجاد میشود. موارد مرگ و میر به ندرت به صورت حاد و ناگهانی و در لحظات اولیه بعد از مصرف متادون بوده و اکثراً طی ۲ ساعت بعد از مصرف مشکل آفرین می شود. این امر به دلیل نیمه عمر طولانی متادون و تجمع تدریجی آن در بدن است.

بیمارانی که در معرض خطر بالاتر مسمومیت هستند:

- افراد مبتلا به ناراحتی قلبی، ریوی و کبدی - کلیوی
- افراد دارای آسیب ها و ضایعات مغزی
- افراد دارای اضافه وزن
- استفاده کنندگان از داروهایی که بر سیستم عصبی مرکزی یا متابولیسم کبدی - کلیوی اثر می گذارند (داروهای مذکور در بخش تداخلات)

علائم مسمومیت:

- خواب آلودگی شدید و کاهش سطح هوشیاری
- تهوع و استفراغ
- تنگی مردمک چشم
- کاهش تنفس (کندی یا قطع تنفس)
- کبودی لبها و ناخن (کمبود اکسیژن)
- عدم تعادل در هنگام راه رفتن
- تکلم بریده بریده و اشکال در تمرکز
- در موارد شدید: تشنج، کما و ایست تنفسی

اقدامات اولیه:

گاهی اوقات سطح هوشیاری بیمار به قدری پایین است که به محرک ها پاسخ نداده و تنفس وی دچار اشکال میگردد. در این صورت میبایست ابتدا با اورژانس تماس و ضمن خواباندن بیمار به پهلوی چپ، از باز بودن راه تنفسی اطمینان حاصل کرد. در صورت وقفه تنفس باید به تنفس مصنوعی اقدام نمود. بخاطر داشته باشید ایست قلبی بواسطه وقفه تنفسی و هیپوکسی ایجاد میگردد. بنابراین رساندن اکسیژن و برقرار تهویه تنفسی اولویت دارد.

اقدامات بیمارستانی:

می‌توان از نالوکسان به صورت عضلانی، زیر جلدی و یا وریدی استفاده نمود. نالوکسان سریعاً باعث افزایش سطح هوشیاری شده و تنفس بیمار را احیاء میکند. در صورت عدم پاسخ تکرار تزریق نالوکسان مجاز است. در صورت پاسخ بیمار به نالوکسان و بازگشت تنفس و هوشیاری، متأسفانه خطر هنوز رفع نشده است. متادون آگونیستی با نیمه عمر و اثر طولانی است و بعد از ناپدید شدن اثر کوتاه مدت نالوکسان، اثرات آن مجدداً به سراغ بیمار خواهد آمد. به همین دلیل الزام است بعد از احیاء تنفس و بازگرداندن سطح هوشیاری بیمار تا چندین ساعت تحت نظر باقی بماند.

شرایط نگهداری :

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



Reference: Medicines. Org. UK/ EMC