

دیکلوفناک سدیم

50 و 100 میلی گرم

شیاف مقعدی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• موارد مصرف

داروی دیکلوفناک سدیم از دسته درمانی ضد التهاب های غیر استروئیدی است که در کاهش درد و التهاب مزمن در موقعیت های مختلف به شرح ذیل موثر است.

- شرایط آرتريت: روماتوئید آرتريت، استئوآرتريت، اسپوندیلیت انکیلوزان، نقرس حاد
- دردهای اسکلتی عضلانی حاد مانند دردهای مفصلی، تاندون و ...
- سایر دردها از جمله درد ناشی از شکستگی استخوان، ضربه، کمر درد، دندان درد، درد عمل جراحی و ...

• راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه هر گونه حساسیت به دیکلوفناک یا هر جزء دیگری از این دارو
- در صورت ابتلا به مشکلات کلیوی و کبدی.
- در صورت ابتلا به مشکلات گوارشی به ویژه خونریزی معده، زخم معده و ...
- در صورت ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی

• مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است:

دوز تعیین شده توسط به صورت معمول روزانه 75-150 میلی گرم است. ماکزیمم دوز مصرفی دیکلوفناک سدیم 150 میلی گرم است که می تواند به صورت ترکیبی با سایر اشکال دارویی دیکلوفناک مانند قرص و کپسول تجویز شود.

نحوه استفاده شیاف:

- هنگامی که این دارو را استعمال می کنید، روده های شما باید خالی باشد.
- اگر به روی شکم یا پهلو روی تخت خوابیده باشد، استعمال شیاف آسان تر است.
- دست هایتان را بشویید. سپس بسته بندی را جدا کنید تا شیاف خارج شود. از شکستن شیاف خودداری کنید.
- به آرامی شیاف را با انتهای نوک تیز به سمت مقعد فشار دهید. برای سهولت در استفاده از شیاف می توانید آن را قبل از استفاده کمی بین دستان خود گرم کنید.
- سعی کنید یک یا دو دقیقه خود را بی حرکت نگه دارید و سپس دست های خود را بشویید.
- در صورت نیاز به استعمال شیاف دیگر، روش فوق را مجدداً دنبال کنید.

• هشدارها

- خونریزی دستگاه گوارش در حین مصرف NSAIDs ها از جمله دیکلوفناک میتواند رخ دهد که عارضه ای خطرناک است و بلافاصله دارو باید قطع شود. بروز این عارضه در افراد مسن ریسک بالاتری دارد. به منظور کاهش ریسک سمیت

دستگاه گوارشی، مصرف این دسته دارویی در بیماران با سابقه خونریزی یا زخم معده باید در پایین ترین دوز درمانی موثر مصرف شود.

- مصرف طولانی مدت داروهای NSAIDs میتواند سبب کاهش عملکرد آنزیم های کبدی شود و پایش عملکرد کبد در مصرف مزمن داروی دیکلوفناک ضروری است.
- مصرف دیکلوفناک در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، پرفشاری خون و بیماری که داروهای موثر بر عملکرد سیستم کلیوی مصرف می کنند باید با احتیاط مصرف شود و عملکرد کلیه پایش گردد.
- در صورت بروز حساسیت و یا مشاهده ی تظاهرات پوستی بعد از مصرف این دارو، بلافاصله مصرف این دارو را قطع کنید و به پزشک خود مراجعه کنید.
- در مصرف طولانی مدت داروی دیکلوفناک یا سایر NSAIDs، پایش تعداد سلول های خونی توصیه می شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید، قصد بارداری دارید به ویژه در 3 ماهه آخر بارداری یا در حال شیردهی هستید، با پزشک و یا داروساز خود قبل از مصرف این دارو مشورت کنید.

• موارد منع مصرف

- مصرف داروی دیکلوفناک در موارد زیر منع مصرف دارد.
- در صورت حساسیت به دیکلوفناک یا هر جزء دیگری از این فرمولاسیون.
- زخم یا خونریزی در سیستم دستگاه گوارش به صورت فعال
- سابقه زخم یا خونریزی معده ناشی از مصرف NSAIDs
- 3 ماهه آخر بارداری
- نارسایی کبدی و کلیوی
- نارسایی احتقانی قلب، بیماری ایسکمیک قلب، بیماری شریانی محیطی یا بیماری عروق مغزی
- بیماریانی که حملات آسم، آذیوادم، کهیر و رینیت حاد آن ها با مصرف ایبوپروفن یا سایر داروهای NSAIDs تشدید می شود.
- التهاب قسمت انتهایی کولون (پروکتیتیس)

• تداخلات دارویی و غذایی

برخی از داروها با یکدیگر تداخل دارند و می تواند اثر آنها را تغییر دهد. در صورت مصرف داروهای زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- لیتیموم و دیگوکسین
- داروهای دیورتیک و ضد پرفشاری خون
- داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت
- داروهای ضد افسردگی SSRI
- داروهای ضد دیابت
- آنتی بیوتیک های کینولونی
- فنی توثین

• عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

اگر هر یک از علائم یا نشانه های زیر را دارید که ممکن است به یک عارضه جانبی بسیار بد مربوط باشد، مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید و یا کمک پزشکی دریافت کنید:

- سیستم عصبی: سردرد، گیجی، خستگی.

- سیستم گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی، ناراحتی معده، تغییر در اشتها
- علائم یک واکنش آلرژیک، مانند بثورات پوستی؛ خارش؛ پوست قرمز، متورم، مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن؛ گرفتگی صدا غیر معمول؛ تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.
- مشکلات کبدی مانند افزایش ترانس آمیناز

• مسمومیت

در صورت مصرف بیش از حد این دارو حتی اگر دچار عوارض خاصی نشدید، فوراً به پزشک خود و یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید از جمله علائم مسمومیت شامل سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، گیجی، منگی، بیهوشی و ... ممکن است رخ دهد.

• شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و گرما نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

