

هیدروکورتیزون

پماد موضعی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

این دارو برای درمان التهابات پوستی یا تظاهرات پوستی خارش دار نظیر اگزما، حساسیت های پوستی، قرمزی و کهیر در سطح پوست استفاده می شود. همچنین از این دارو در خارش های مقعدی ناشی از التهابات هموروئیدی، نیز استفاده می شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع حساسیت نسبت به هیدروکورتیزون یا سایر کورتیکواستروئیدها مانند بتامتازون، کلوبتازول، تربامسینولون، فلوئوسینولون و ...، همچنین حساسیت به مواد دیگر مثل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
 - در مصرف طولانی مدت و بروز علائم سیستمیک
 - در صورت مصرف طولانی مدت دارو توسط کودکان

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد و متناسب با بیماری فرد تعیین توسط پزشک مشخص می شود اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است: بزرگسالان بالای ۱۲ سال: 1 یا 2 مرتبه در روز، یک لایه نازک بر روی پوست مالیده شود تا زمانیکه بهبودی حاصل گردد. (حداکثر زمان مصرف ۱ هفته می باشد).

در افراد کمتر از 10 سال مصرف این دارو جز با تجویز پزشک توصیه نمی گردد.

هشدارها

- در صورت عدم بهبودی در طی ۲-۴ هفته به پزشک جهت ارزیابی مجدد ضایعه مراجعه نمایید.
- منطقه مورد نظر را پانسمان نکنید زیرا به علت افزایش جذب دارو سبب تشدید عوارض جانبی می گردد.
- مصرف طولانی مدت این دارو به دلیل سرکوب سیستم هیپوفیز و بروز اختلال در سیستم رشد کودکان محدودیت مصرف دارد و باید با احتیاط و در دوزهای پایین تر مصرف شود.
- در صورت مشاهده علائم موضعی و عدم بهبود پس از قطع دارو در محل استعمال مانند کاهش رنگ پوست، جوش های پوستی، بروز آلرژی در محل، آتروفی پوستی به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بروز خونریزی مقعدی پس از استفاده از پماد هیدروکورتیزون از ادامه مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی به دلیل عدم وجود اطلاعات غیرمجاز است مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص.

موارد منع مصرف

این دارو در درصورت ابتلا به بیماری های عفونی یا ویروسی، عفونت قارچی یا باکتریایی پوستی، جراحات، التهاب ناشی از تزریق واکسن، آکنه روزاسه، پرواریتیس (خارش و قرمزی به ویژه در شب ها) نواحی ژنیتال و مقعدی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

در حین مصرف این دارو ممکن است عوارض زیر رخ دهد:

بروز واکنش های حساسیتی در محل، بروز مویرگ های تار عنکبوتی، نازکی پوست، تغییر رنگ پوست ناحیه استعمال، آتروفی پوست، عفونت پوستی ثانویه، خونریزی مقعدی و ...

شرایط نگهداری :

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



REFERENCES:

Medicines.org.uk/EMC
WWW.Uptodate.Com