

استامینوفن کدئین

استامینوفن ۳۰۰ میلیگرم

کدئین ۲۰ میلیگرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

مورد استفاده جهت تسکین دردهای شدید زمانیکه درمان‌های جایگزین کافی نمی باشد.

راهنمای‌های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

•اگر به استامینوفن، کدئین یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.

• راگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که تجربه کردید مانند راش، خارش، تنگی نفس، خس خس سینه، سرفه، تورم صورت، لب ها، زبان، گلو و یا هر نشانه دیگری اطلاع دهید.

• اگر هر یک از این مشکلات را دارید: مشکلات ربوی یا تنفسی مانند آسم، مشکل در تنفس، یا آپنه خواب. سطح بالای دی اکسید کربن در خون؛ انسداد یا باریک شدن معده یا روده.

•اگر در ۱۴ روز گذشته از داروهای خاصی که برای افسردگی استفاده می شوند مانند ایزوکاربوکسازید، ترانیل سیپرومین یا داروهایی که برای بیماری پارکینسون استفاده می شوند مانند سلژیلین یا راساژیلین مصرف کرده اید. مصرف این دارو در عرض ۱۴ روز پس از آن داروها می تواند باعث فشار خون بسیار بد شود.

•اگر در حال شیردهی هستید. در طول مصرف این دارو از شیر دادن خودداری کنید.

به پزشک و داروساز خود در مورد تمام داروها (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و بیماری های خود اطلاع دهید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع، قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

یک قرص هر ۴ ساعت در صورت نیاز

حداکثر دوز روزانه: استامینوفن ۴۰۰۰ میلی گرم/کدئین ۳۶۰ میلی گرم

هشدارها

در مصرف این دارو احتیاط کنید و با پزشک خود مشورت کنید اگر:

• به اپیوئیدها، الکل و یا داروهای غیرقانونی معتاد هستید و یا تا به حال اعتیاد داشته اید.

• سابقه تجربه علائم ترک مانند بی قراری، اضطراب، لرزش یا عرق کردن، زمانی که مصرف الکل یا مواد مخدر را متوقف کرده اید، داشته اید.

• احساس می کنید که باید مقدار داروی بیشتری مصرف کنید تا به همان میزان تسکین درد برسید، این ممکن است به این معنی باشد که شما نسبت به اثرات این دارو مقاوم و یا معتاد شده اید. با پزشک یا داروساز در این باره مشورت کنید و ممکن است دوز شما را تغییر دهند و یا یک مسکن جایگزین پیشنهاد دهند.

• مشکلات کلیوی یا کبدی شدید دارید.

• مشکل در دفع آب یا مشکلات پروستات دارید.

• مشکل روده مانند کولیت یا بیماری کرون یا انسداد روده دارید.

• مسن هستید.

• بیماری میاستنی گراویس دارید که ماهیچه ها را ضعیف می کند.

• از کم کاری تیروئید رنج می برید.

• بیماری غده فوق کلیوی به نام آدیسون دارید.

• در حال مصرف بنزودیازپین (کلردیازپوکساید، کلونازپام، آلپرازولام و...) هستید.

• از تشنج رنج می برید.

کدئین در کبد توسط آنزیمی به مورفین تبدیل می شود. مورفین ماده ای است که سبب تسکین درد میشود. برخی افراد دارای تنوعی از این آنزیم هستند و این می تواند افراد را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد. در برخی از افراد مورفین در مقادیر بسیار کم تولید یا تولید نمی شود بنابراین به اندازه ی کافی درد را تسکین نخواهد داد. در عده ای دیگر به دلیل مقدار بسیار زیاد مورفین، احتمال بیشتری برای ابتلا به عوارض جانبی جدی وجود دارد.

در صورت مشاهده هر یک از عوارض جانبی زیر، باید مصرف آن را قطع کنید و کمک های درمانی دریافت کنید:

تنفس آهسته یا کم عمق، گیجی، خواب آلودگی، کوچک شدن مردمک چشم، احساس بیماری، یبوست، بی اشتهایی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

•اگر باردار هستید یا فکر می کنید ممکن است باردار باشید، از مصرف این دارو بپرهیزید.

•اگر در دوران بارداری از این دارو استفاده کنید، ممکن است کودک شما وابسته شود و بعد از زایمان علائم ترک را تجربه کند که ممکن است نیاز به درمان داشته باشد.

• در دوران شیردهی این دارو را مصرف نکنید زیرا کدئین وارد شیر مادر می شود و روی کودک شما تاثیر خواهد گذاشت.

موارد منع مصرف

از مصرف این دارو خودداری کنید اگر:

• به این دارو یا هر جزء دیگری از این فرمولاسیون حساسیت دارید. علائم واکنش آلرژیک می تواند شامل بثورات پوستی، مشکلات تنفسی، تورم صورت، گلو یا زبان و... باشد.

• حملات شدید آسم یا مشکلات شدید تنفسی دارید.

• اخیراً دچار آسیب به سر شده اید.

• دچار افزایش فشار در سر شده اید. (علائم این امر عبارتند از: سردرد، استفراغ و تاری دید).

• اخیراً کبد، کیسه صفرا یا مجرای صفراوی خود را تحت عمل جراحی قرار داده اید.

• برای درمان افسردگی دارویی از خانواده MAOI (مهارکننده های مونوآمین اکسیداز) مانند ترانیل سیپرومین مصرف می کنید یا در طول ۲ هفته گذشته مصرف کرده اید.

• از فرآورده های الکلی استفاده می کنید.

• انسداد دستگاه گوارش، از جمله ایلئوس فلج

• فردی که قصد مصرف این قرص را دارد کمتر از ۱۲ سال سن داشته باشد.

• کمتر از ۱۸ سال سن دارید و لوزه ها یا آدنوئیدهای خود را به دلیل آپنه انسدادی خواب برداشته اید.

• بدن شما خیلی سریع کدئین را به مورفین متابولیزه می کند.

• در حال شیردهی هستید.

تداخلات دارویی و غذایی

– اگر داروهای زیر را مصرف می کنید، اخیراً مصرف کرده اید (در طول ۲ هفته گذشته) یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

• مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز(MAOIs) مانند ایزوکربوکسازید و ترانیل سیپرومین که در درمان افسردگی استفاده می‌شوند.

• داروهایی که باعث گیجی یا خواب آلودگی شما می شوند (تضعیف کننده های CNS (مانند زولپیدم) و بنزودیازپین ها) مانند داروهایی که برای درمان اضطراب استفاده می شود و یا داروهای بیهوشی.

• داروهای افسردگی مانند میرتازاپین یا کلرپرومازین

• داروهایی که به عنوان آرام بخش یا خواب آور شناخته می شوند.

• قرص خواب، آرام بخش و برخی آنتی هیستامین ها (مانند آزلاستین).

اگر این داروها را همراه با استامینوفن کدئین مصرف کنید، ممکن است خواب آلودگی بیشتری را تجربه کنید.

مصرف همزمان این دارو و داروهای آرام بخش مانند بنزودیازپین ها یا سایر داروهای نام برده خطر خواب آلودگی، مشکلات تنفسی (دپرسیون تنفسی) و کما را افزایش می دهد و ممکن است تهدید کننده زندگی باشد به همین دلیل، مصرف همزمان این داروها تنها در صورتی امکان پذیر است که طبق دستور پزشک باشد.

داروهای زیر

– در حین مصرف این دارو، از مصرف فرآورده های دیگری که حاوی استامینوفن هستند بپرهیزید.

– همچنین اگر داروهای زیر را مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

• داروهایی که برای رقیق کردن خون استفاده می شود مانند وارفارین.

• کلرامفتیکل – آنتی بیوتیکی که برای عفونت ها استفاده می شود.

• متوکلوپرامید یا دومپریدون – برای جلوگیری از تهوع و استفراغ.

• کلستیرامین – برای کاهش سطح کلسترول خون.

• قرص ضد بارداری خوراکی.

• نالتراکسون (خنثی کننده اثر اپیوئیدها)

– در حین مصرف این قرص از مصرف فرآورده های الکلی بپرهیزید.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

سرگیجه، خواب‌آلودگی، نارضایتی، سرخوشی، آرام‌بخشی، سندرم سروتونین خارش و یا بثورات پوستی، درد شکم، یبوست، حالت تهوع، استفراغ، واکنش ازدیاد حساسیت، تنگی نفس

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتز از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

در صورت مصرف بیش از حد این دارو حتی اگر احساس بدی ندارید، فوراً با پزشک صحبت کنید. زیرا مقادیر بیش از حد استامینوفن می تواند باعث آسیب تاخیری و جدی کبد شود.

• به یاد داشته باشید که هر قرص و بسته باقی مانده را همراه با خود به مراکز درمانی ببرید تا پزشک از دارویی که مصرف کرده اید مطلع شود.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران – ایران

