

ایبوپروفن

۴۰۰ میلی گرم

قرص روکشدار

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

این دارو متعلق به گروهی از داروها به نام ضد التهاب های غیر استروئیدی(NSAIDs) می باشد، که برای تسکین درد و کاهش التهاب استفاده می شوند.

از این دارو برای تسکین سردرد، دردهای روماتیسمی و عضلانی، دردهای ناشی از شرایط غیر جدی آرتريت، کمردرد، میگرن، درد پریود، درد دندان و نورالژی. همچنین می توان از آن برای کاهش تب و تسکین علائم سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده کرد.

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

-اگر به ایبوپروفن، آسپرین، NSAIDs (مانند دیکلوفناک، ناپروکسن، ملوکسیکام و...) و یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.

-اگر به هر هر دارو، غذا یا مواد دیگری حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که داشتید، مانند راش، خارش، تنگی نفس، خس خس سینه، سرفه، تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو و یا هر نشانه دیگری اطلاع دهید.

-اگر خونریزی گوارشی یا مشکلات کلیوی دارید.

-اگر برای باردار شدن مشکل دارید یا باروری خود را بررسی می کنید.

-اگر باردار هستید و یا ممکن است باردار باشید. اگر در سه ماهه سوم بارداری هستید از مصرف این دارو خودداری کنید. همچنین ممکن است لازم باشد طبق دستور پزشک در زمان های دیگری در دوران بارداری نیز از مصرف این دارو اجتناب کنید.

-اگر هر NSAID دیگری مصرف می کنید.

-اگر از داروهای سالیسیلاتی مانند آسپرین استفاده می کنید.

-اگر پمترکسید مصرف می کنید.

به پزشک و داروساز خود در مورد تمام داروها (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و بیماری های خود بگویید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما یا تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع و قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت در صورت نیاز همراه غذا مصرف شود؛ حداکثر دوز روزانه : ۳۲۰۰ میلی گرم در روز

مصرف در بیماری های خاص

در بیماران کلیوی با $CrCl \leq 30$ میلی لیتر در دقیقه و بیماران دیالیزی این فرآورده منع مصرف دارد.

هشدارها

- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی، سرگیجه، تاری دید شود لذا در انجام مواردی که نیاز به هوشیاری ذهنی دارند (مانند رانندگی یا استفاده از ماشین آلات) احتیاط کنید.

- استفاده از این دارو ممکن است باعث افزایش خطر هیپرکالمی، به ویژه در بیماران بالای ۶۵ سال، در بیماران مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی و یا استفاده همزمان با سایر داروهایی که باعث هیپرکالمی (به عنوان مثال، مهارکننده های ACE) می شود شود. بنابراین در صورت مصرف مزمن این دارو سطح پتاسیم سرم را به دقت کنترل کنید.

- تاری/کاهش دید، و تغییر رنگ بینایی در مصرف این دارو گزارش شده است. در صورت بروز چنین علائمی درمان را قطع کنید و به چشم پزشک مراجعه کنید.

- این دارو ممکن است خطر مننژیت آسپتیک را افزایش دهد، به ویژه در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و اختلالات بافت همبند.

- پروتئواسپاسم شدید و کشنده ممکن است رخ دهد. در بیماران مبتلا به سایر اشکال آسم با احتیاط مصرف شود.

- از مصرف مزمن این دارو پس از جراحی چاقی خودداری کنید زیرا ممکن است منجر به ایجاد زخم و سوراخ های آناستوموز شود.

- در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.

- در صورتی بیماران دارای درد یا ناراحتی مکرر، زخم و یا خونریزی معده، فشار خون بالا، بیماری قلبی، کلیوی و یا سایر بیماری های زمینه ای هستند و یا در حال حاضر از یک دیورتیک، آسپرین، ضد انعقاد استفاده می کنند و یا بالای ۶۰ هستند، قبل از خوددرمانی حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

بارداری:

مصرف این فرآورده در سه ماه سوم بارداری ممنوع است و همچنین در سه ماه اول و دوم بارداری در صورت ضرورت و تنها با تجویز پزشک متخصص مجاز است.

شیردهی:

اگر به نوزاد خود شیر می دهید، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف

- اگر سابقه زخم ، سوراخ شدن یا خونریزی دستگاه گوارش داشته اید.
- اگر سابقه خونریزی یا سوراخ شدن دستگاه گوارش، مربوط به استفاده قبلی از NSAID ها (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی) داشته اید.
- اگر به ایبوپروفن یا هر جزء دیگری از این دارو، آسپرین یا سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی حساسیت دارید. (تا به حال آسم، آبریزش بینی، خارش پوست یا تورم لب ها، صورت یا گلو پس از مصرف این داروها داشته اید).
- اگر آسپرین یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مصرف می کنید.
- اگر نارسایی شدید قلب، کلیه یا کبد، فشار خون بالا یا اختلال انعقاد خون دارید.
- اگر باردار هستید و در سه ماه آخر بارداری هستید.
- اگر مشکلات تنفسی دارید.
- اگر کمتر از ۱۲ سال سن دارید.

تداخلات دارویی و غذایی

قبل از مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را از هر داروی دیگری که مصرف می کنید مطلع سازید. عملکرد ایبوپروفن ممکن است تحت تأثیر این دارو ها قرار گیرد و یا ممکن است عملکرد آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

مصرف همزمان ایبوپروفن و داروهای آپیکسابان، سیکلوسپورین، دابی گاتران، انوکسپارین، هیراین، ایمانتینیب، لیتیموم، فوروزماید، متوترکسات، پمترکسید، ریزاروکسaban، SSRI ها (سرترالین، سیتالوپرام، فلوکستین و...)، تنوفویر، آسپرین و وارفارین دارای تداخل دارویی رده D می باشد و نیازمند اصلاح درمان می باشد.

مصرف همزمان ایبوپروفن با اورکیناز و یا سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی (کتورولاک، دیکلوفناک و...) دارای تداخل دارویی رده X می باشد و باید از مصرف همزمان ایبوپروفن با این داروها پرهیز کرد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

<۱٪:
۱٪ تا ۱۰٪:
هماتولوژیک و انکولوژیک: کاهش هموگلوبین

قلبی عروقی: ادم
دستگاه گوارش: کرامپ، ناراحتی و درد شکم، نفخ ، یبوست، کاهش اشتها، اسهال، سوء هاضمه، درد اپی گاستر، سوزش سر دل، تهوع و استفراغ
درماتولوژیک: راش ماکولوپاپولار، خارش، بثورات پوستی
غدد درون ریز و متابولیک: احتیاس مایعات
سیستم عصبی: سرگیجه، سردرد، اضطراب
شنوایی: وزوز گوش

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتز از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران – ایران

