

آمپول دکسپانتنول

محلول تزریقی

آمپول دکسپانتنول دارای ۲ میلی لیتر محلول است و هر یک میلی لیتر آن حاوی ۲۵۰ میلی گرم دکسپانتنول است.

سایر ترکیبات :

انهیدروس تری سدیم سیترات، انهیدروس سیتریک اسید، آب قابل تزریق.

- دسته دارویی:

ویتامین محلول در آب

- مکانسیم اثر:

دکسپانتنول یکی از مشتقات پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) است که برای سنتز و نگهداری کوآنزیم A مورد نیاز است.

- موارد مصرف:

پیشگیری و درمان کمبود پانتوتنیک اسید، کمک به درمان ریزش مو پراکنده و منتشر، پیشگیری و کنترل اختلالات دستگاه گوارش، پیشگیری از بروز ایلئوس پارالیتیک بعد از اعمال جراحی شکم، درمان ایلئوس پارالیتیک، درمان حرکات روده ای کاهش یافته

- موارد منع مصرف:

حساسیت به دکسپانتنول و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون این فرآورده

- موارد احتیاط مصرف:

فقط محلول بی رنگ، شفاف و عاری از ذره قابل مصرف است.

در صورت بروز علائم حساسیت مصرف دارو قطع شود.

مدیریت ایلئوس آدینامیک شامل اصلاح هر گونه عدم تعادل مایعات و الکترولیت ها (به ویژه هایپو کالمی)، کم خونی، هایپوپروتئینمیا، درمان عفونت و در صورت امکان اجتناب از مصرف داروهایی است که باعث کاهش تحرک و کاهش فشار دستگاه گوارش می شوند.

- **مقدار و نحوه مصرف:**

به صورت عضلانی (روش معمول تزریق) و یا انفوزیون آهسته وریدی تزریق شود.

در صورت نیاز به تزریق وریدی محتویات یک آمپول ۲ میلی لیتری (۵۰۰ میلی گرم دارو) به حجم زیادی از سرم تزریقی دکستروز ۵٪ و یا رینگر لاکتات افزوده شود و به صورت انفوزیون آهسته وریدی تزریق گردد. سپس طی یک ساعت از سوکسینیل کولین استفاده شود.

مقدار مصرف هر دارو را **پزشک** تعیین می نماید. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:
1 یا ۲ آمپول ۳ بار در هفته به صورت عضلانی به مدت ۶ هفته تزریق گردد.

پیشگیری از بروز ایلئوس پارالیتیک بعد از اعمال جراحی شکم: ۲۵۰ میلی گرم عضلانی، یا ۵۰۰ میلی گرم عضلانی یا وریدی. پس از ۲ ساعت دوز تکرار شود و سپس هر ۶ ساعت تکرار شود تا زمانی که خطر بروز ایلئوس پارالیتیک کاملاً رفع گردد.

درمان ایلئوس پارالیتیک: ۵۰۰ میلی گرم عضلانی یا وریدی. پس از ۲ ساعت دوز تکرار شود و سپس در صورت نیاز هر ۶ ساعت تکرار شود.

- **بارداری:**

ویتامین های محلول در آب از جفت عبور می کنند. دارو زیر نظر **پزشک متخصص** مصرف شود.

- **شیردهی:**

دکسپانتنول به شیر مادر ترشح می شود. در شیردهی زیر نظر **پزشک متخصص** مصرف شود.

- **تداخلات دارویی:**

تداخل دارویی معناداری با داروی خاصی ندارد.

- **تداخل با تست آزمایشگاهی:**

تاکنون تداخل مهمی یافت نشده است.

- **عوارض جانبی:**

تاکنون عوارض مهمی گزارش نگردیده است و در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

- **شرایط نگهداری:**

— در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

— تا زمان مصرف دارو درون جعبه و دور از نور نگهداری شود.

— دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- فرآورده برای یکبار مصرف است. پس از مصرف، باقی مانده دارو را دور بریزید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

References:

- UpToDate 2023
- Drug Facts and Comparisons 2017