ویتامین B6

آمپول 100mg/2ml و 300mg/3ml

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصـرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگـران خودداری نمایید.

- **دسته دارویی**

ویتامین محلول در آب.

- **موارد مصرف**

- کمبود پیریدوکسین (ویتامین B6)

- **راهنمایی پیش از مصرف**

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

- در صورت حساسیت به این دارو، هر دارو، غذا یا ماده دیگر
- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری های مزمن و زمینه
-در صورت مصرف داروی لوودوپا
-در صورت بارداری یا شیردهی
-در صورت مصرف هرگونه دارو به صورت مزمن

- **موارد منع مصرف**

- حساسیت به پیریدوکسین یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

- **موارد احتیاط مصرف:**

- در صورت احساس سوزش، بی حسی یا گزگز غیر طبیعی.
-در صورت بروز واکنش آلرژیک مانند: راش پوستی، کهیر، خارش، قرمزی یا تورم، تاول یا پوسته پوسته شدن پوست(با یا بدون تب)، خس خس سینه، احساس تنگی در قفسه سینه یا گلو، مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن، گرفتگی صدای غیر معمول یا تورم در دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.

- **هشدارها:**

- این دارو ممکن است حاوی آلمینیوم باشد. در صورت استفاده طولانی مدت، احتمال بروز مسمومیت با آلمینیوم (به خصوص در افراد دارای مشکلات کلیوی و نوزادان نارس) وجود دارد.
- مصرف دوز های بیش از 200 میلی گرم در روز، باعث وابستگی و علائم سندرم قطع میشود.
- در کودکان در دوز های بالا، با نوروپاتی حسی و حرکتی همراه بوده است. این حالات با قطع دارو برگشت پذیر است.

- **مصرف در دوران بارداری و شیردهی**

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی با تشخیص پزشک مجاز می باشد.

- **مقدار و نحوه مصرف**

- این دارو به صورت داخل عضلانی(IM) یا داخل وریدی(IV) تجویز شود.
- میزان مصرف این دارو با تجویز پزشک صورت میگیرد.

- **تداخلات دارویی**

- ویتامین B6 ممکن است اثر درمانی لوودوپا را کاهش دهد بنابراین از استفاده همزمان آن ها خودداری شود.

- **عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- کمبود فولات
- سیستم عصبی: خواب آلودگی، احساس سوزش یا گزگز

- **پایش های کنترلی حین مصرف دارو**

در بیماران تحت درمان مزمن با دوز های بالا، انجام تست سرعت هدایت عصبی هر 1-2 سال یک بار، در نظر گرفته شود.

- **شرایط نگهداری :**

- دارو در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود. (این دارو به نور بسیار حساس است)
-فقط برای استفاده تک دوز است و پس از مصرف، باقی مانده دارو دور ریخته شود.
-دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
-از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران