

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و باسابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

فاموتیدین

قرص روکشدار 20 میلی گرم

قرص روکشدار 40 میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قرص فاموتیدین چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قرص فاموتیدین باید بدانید
3. نحوه استفاده از قرص فاموتیدین
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قرص فاموتیدین

1. قرص فاموتیدین چیست و چه کاربردی دارد؟

1.1. موارد مصرف درمانی

فاموتیدین با کاهش میزان اسید تولید شده در معده برای درمان موارد زیر استفاده می‌شود:

- زخم معده/ دوازدهه
- رفلاکس ازوفاژیت
- سندرم زولینگر-الیسون (یک اختلال نادر که شامل زخم‌ها و تومورهای مکرر در معده و روده می‌شود)

2. آنچه قبل از مصرف قرص فاموتیدین باید بدانید

2.1. موارد منع مصرف

- حساسیت به ماده موثره یا هر یک از مواد جانبی
- حساسیت متقاطع در این دسته از ترکیبات مشاهده شده است. بنابراین، فاموتیدین نباید برای بیمارانی که سابقه حساسیت به سایر آنتاگونیست‌های گیرنده H₂ (مانند سایمتیدین) دارند، تجویز شود.

2.2. اقدامات احتیاطی

- قبل از مصرف فاموتیدین با پزشک خود مشورت کنید اگر:
 - احتمال وجود تومور بدخیم در معده شما وجود دارد
 - از مشکلات کلیوی رنج می‌برید
 - مدت طولانی است که دوز بالایی از فاموتیدین مصرف می‌کنید.
- کمبود ویتامین B₁₂: درمان طولانی مدت (≤2 سال) ممکن است منجر به سوء جذب ویتامین B₁₂ و متعاقباً کمبود ویتامین B₁₂ شود.
- اختلال کلیوی: در بیماران مبتلا به اختلال کلیوی متوسط تا شدید ($\text{CrCl} < 50$ میلی لیتر در دقیقه) با احتیاط مصرف شود.

۲,۳ بارداری و شیردهی

فاموتیدین در دوران بارداری توصیه نمی‌شود، مگر اینکه پزشک شما آن را به وضوح ضروری بداند. اگر در حال شیردهی هستید، باید مصرف فاموتیدین را متوقف کنید یا شیردهی را متوقف کنید زیرا در شیر مادر دفع می‌شود.

2.4. رانندگی و استفاده از ماشین آلات

در هنگام مصرف فاموتیدین، ممکن است احساس سرگیجه یا سردرد داشته باشید. در صورت بروز این علائم، نباید رانندگی کنید یا با ماشین‌آلات کار کنید یا فعالیت‌هایی را انجام دهید که نیاز به هوشیاری و واکنش سریع دارند.

2.5. تداخلات دارویی

قبل از مصرف این قرص‌ها، اگر داروهای دیگری مصرف می‌کنید، اخیراً مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید، به ویژه هر یک از موارد زیر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- فاموتیدین ممکن است اثر داساتینیب، ارلوتینیب، جفیتینیب، پازوپانیب (داروهای مورد استفاده برای درمان سرطان) را کاهش دهد.
- کتوکونازول یا ایتراکونازول (باید ۲ ساعت قبل از فاموتیدین تجویز شود)
- آنتی اسیدها، برای سوء هاضمه (فاموتیدین باید ۱-۲ ساعت قبل از مصرف آنتی اسید مصرف شود).
- سوکرافیت، که برای درمان و جلوگیری از عود زخم‌ها استفاده می‌شود (سوکرافیت نباید ظرف ۲ ساعت پس از مصرف فاموتیدین تجویز شود).
- کربنات کلسیم، مورد استفاده به عنوان دارویی برای سطح بالای فسفات خون در بیماران مبتلا به دیالیز

3. نحوه مصرف فاموتیدین

1.3. دوز مصرف

• بزرگسالان و سالمندان

زخم معده

مقدار مصرف توصیه شده 40 میلی گرم، یک بار در روز، شب‌ها است.
مدت زمان درمان معمولاً بین 4 تا 8 هفته خواهد بود. در بیشتر موارد، زخم با این درمان ظرف 4 هفته بهبود می‌یابد. اگر زخم شما به طور کامل بهبود نیافته باشد، درمان ممکن است 4 هفته دیگر ادامه یابد.
برای درمان زخم عودکننده، مقدار مصرف توصیه شده 20 میلی گرم در شب است.

سندرم زولینگر-الیسون

مقدار مصرف توصیه شده 20 میلی گرم هر شش ساعت است. سپس مقدار مصرف باید تنظیم شود.

رفلاکس ازوفاژیت

دوز توصیه شده برای درمان علائم خفیف ۲۰ میلی گرم دو بار در روز است.
دوز توصیه شده برای درمان علائم خفیف تا متوسط ۴۰ میلی گرم دو بار در روز است.
درمان باید به مدت ۶ تا ۱۲ هفته ادامه یابد.

بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی/دیالیز

اگر از اختلالات کلیوی رنج می‌برید، پزشک احتمالاً دوز شما را کاهش می‌دهد.
فاموتیدین باید در پایان دیالیز یا بعد از آن تجویز شود زیرا مقداری از ماده مؤثر توسط دیالیز دفع می‌شود.

• مصرف در کودکان

فاموتیدین برای کودکان توصیه نمی‌شود.

2.3. روش مصرف

این دارو را می‌توان با یا بدون غذا مصرف کرد. قرص‌ها را با یک لیوان آب ببلعید. آنها را نجوید.

3.3. مصرف بیش از حد

با پزشک یا نزدیک‌ترین بخش اورژانس بیمارستان تماس بگیرید. در صورت مراجعه به پزشک یا بیمارستان، ظرف دارو را با خود ببرید.

3.4. اگر مصرف فاموتیدین را فراموش کردید

برای جبران دوز فراموش شده، دوز دو برابر مصرف نکنید.

4. عوارض جانبی احتمالی

مانند همه داروها، این دارو نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد به آنها مبتلا نمی‌شوند. اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

در صورت بروز علائم زیر، فوراً به پزشک مراجعه کنید:

- واکنش‌های آلرژیک: تورم صورت، گلو یا زبان، سرگیجه (آنافیلاکسی)
- مشکل در تنفس یا خس خس سینه (برونکواسپاسم)
- تاول شدید پوست، دهان، چشم‌ها و اندام تناسلی (سندرم استیونز جانسون)
- تنگی نفس یا سرفه خشک به دلیل التهاب ریه‌ها (پنومونی بینابینی)
- تورم لایه‌های عمیق‌تر پوست ناشی از تجمع مایع (ادم آنژیونورتیک)

عوارض جانبی شایع

- سردرد
- سرگیجه
- یبوست
- اسهال

5. نحوه نگهداری

این دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. از نور و رطوبت محافظت شود.