

آپمول فاموتیدین ۲۰

محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت تزریق/انفوزیون

هر آپمول ۲ میلی لیتری حاوی:
فاموتیدین ۲۰ میلی گرم

• **دسته دارویی:**
آنتاگونیست گیرنده H_2 ، آنتی اسید

• موارد مصرف:

تزریق فاموتیدین در برخی از بیماران بستری با شرایط ترشح بیش از حد پاتولوژیک یا زخم های غیر قابل درمان و یا به عنوان جایگزینی برای اشکال دارویی خوراکی برای استفاده کوتاه مدت در بیماران که قادر به مصرف داروهای خوراکی برای شرایط به شرح زیر نیستند اندیکاسیون دارد:
۱. درمان کوتاه مدت زخم اثنی عشر فعال.
۲. درمان نگهدارنده با دوز کاهش یافته برای بیماران زخم اثنی عشر پس از بهبود زخم فعال.
۳. درمان کوتاه مدت زخم معده خوش خیم فعال.
۴. درمان کوتاه مدت بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD).
۵. درمان بیماری های هاپی-سکرتوری پاتولوژیک (به عنوان مثال: سندرم زولینگر-الیسون، آدنوم متعدد غدد درون ریز).

• موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به فاموتیدین و یا هر داروی دیگری از گروه H_2 بلکرها

• موارد احتیاط مصرف:

- فرآورده باید شفاف، بی رنگ و عاری از هر گونه ذره باشد؛ در غیر این صورت از مصرف آن خودداری نمایید.
- قبل از شروع درمان زخم های گوارشی با فاموتیدین، بیمار باید از لحاظ داشتن بدخیمی در دستگاه گوارش ارزیابی گردد.
- در افرادی که کمبود ویتامین B_{12} دارند با احتیاط مصرف گردد.
- در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود و تنظیم دوز صورت گیرد. برای کسانی که کلیانس کراتینین کمتر از ۵۰ میلی لیتر در دقیقه دارند؛ نصف دوز معمول تجویز شود و یا در صورت تجویز دوز معمول فاصله زمانی میان مصرف دو دوز متوالی به ۳۶ تا ۴۸ ساعت افزایش یابد.
- در کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود.

• روش و مقدار دوز مصرفی:

فقط به صورت تزریق آهسته وریدی و انفوزیون وریدی مصرف گردد.

طول دوره درمان، مقدار و دوز مصرفی بر اساس وضعیت بدن هر فرد توسط پزشک تعیین می گردد.

تزریق آهسته وریدی (حداقل طی مدت ۲ دقیقه):

محتویات یک آپمول فاموتیدین را با حلال های مناسب جهت رقیق سازی رقیق کرده و به حجم ۵ تا ۱۰ میلی لیتر برسانید.

انفوزیون وریدی (طی مدت ۱۵-۳۰ دقیقه):

محتویات یک آپمول فاموتیدین را در ۱۰۰ میلی لیتر از حلال های مناسب جهت رقیق سازی رقیق کنید.

حلال های مناسب جهت رقیق سازی:

محلول تزریقی دکستروز ۵ درصد، محلول تزریقی سدیم کلراید ۰/۹ درصد، محلول تزریقی رینگر لاکتان.

دوز معمول بزرگسالان:

۲۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت

دوز معمول کودکان (۱ تا ۱۶ سال):

۰/۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت

*پیشینه دوز مجاز مصرفی برای کودکان روزانه ۴۰ میلی گرم است.

• بارداری:

این دارو از جفت عبور می کند. مصرف آن در دوران بارداری تنها در مواقع ضروری و زیر نظر پزشک متخصص مجاز است.

• شیردهی:

مصرف آن در دوران شیردهی تنها با نظر پزشک متخصص مجاز است. از آن جایی که فاموتیدین به شیر ترشح می شود می توان مصرف آن را در دوران شیردهی قطع کرد و یا در صورت نیاز به مصرف دارو از شیردهی پرهیز شود.

• تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان با داروهای زیر خودداری شود:
سفوروکسیم، داساتینیب، سوتوراسیب، دلاویردین، دی-کلرفنامید، پازوپانسیب، ریزدرونا، نراتینیب، لوکتوکونازول، سفیدیتون
در صورت استفاده از داروهای زیر حتما پزشک خود را مطلع سازید:
اکالابروتینیب، آتازانابر، بوسوتینیب، داکومیتینیب، ارلوتینیب، جفتینیب، ایتراکونازول، کتوکونازول، لدیاسویر، نراتینیب، نیلوتینیب

• پایش های کنترلی حین مصرف:

تست شمارش کامل خون (CBC)، pH معده، بررسی وجود خون مخفی و خونریزی گوارشی

• عوارض جانبی:

آزیتاسیون، سردرد، سرگیجه، اسهال، یبوست، تحریک محل تزریق

• نگهداری:

- در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد)، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- هر آپمول برای یک بار مصرف است و باقی مانده دارو را پس از مصرف دور بریزید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



Reference:

<https://www.pdr.net/drug-summary/>
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/201/20249S12LBL.PDF
<https://www.medicines.org.uk/emc#ref>
Drugs Facts And Comparisons 2017
Handbook On Injectable Drugs 19th Edition
<https://uptodate.com/>